

BELAGIO

SUPLEMENTO ALIMENTAR

Apresentação

Embalagem de 60 cápsulas

Ingredientes	Por 1 Cápsula	TDR (2 Cápsulas)	TDR (3 Cápsulas)	% VRN*
Extrato de Salva (<i>Salvia officinalis</i> padronizado a 2,5% de ácido rosmarínico)	200 mg	400 mg	600 mg	-
Extrato de Acteia de bagas negras (<i>Cimicifuga racemosa</i> padronizada a 2,5% de Saponinas)	100 mg	200 mg	300 mg	-

Cápsula: Gelatina, Dióxido de Titânio (Corante).

*VRN = Valores de Referência do Nutriente: Regulamento (EU) nº 1169/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2011.

Indicações

Afrontamentos, insónias, sudação intensa diurna ou nocturna associados ao climatério.

Alterações do humor e diminuição da líbido associadas ao climatério.

Depressão e ansiedade relacionadas com pré-menopausa e menopausa.

Retenção de líquidos, pernas pesadas, edemas dos membros inferiores e outros problemas circulatórios.

Toma diária recomendada (TDR)

1 cápsula 2 a 3 vezes por dia.

Se necessário tomar 1 cápsula, no início dos afrontamentos.

Em caso de sudação noturna intensa, tomar 2 cápsulas ao deitar.

Características

Cimicifuga

Reduz os afrontamentos do climatério (pré-menopausa, menopausa e pós-menopausa). Eficaz no tratamento da depressão e da ansiedade associadas à menopausa, regula a resposta hormonal da hipófise à diminuição de estrogénios e minimiza o problema das insónias.

Salva

Exerce uma marcada acção anti-transpirante, melhora a função da líbido e reduz a irritabilidade das mulheres na fase da pré-menopausa. Diminui consideravelmente os problemas circulatórios e a retenção de líquidos.

Recomendações

Não deve ser excedida a toma diária indicada.

Os suplementos alimentares não são substitutos de um regime alimentar variado e equilibrado nem de um modo de vida saudável.

Conservar na embalagem original protegida da luz, em local seco e a temperatura inferior a 25°C.

Manter fora da vista e do alcance das crianças.

O uso seguro durante a gravidez e amamentação não foi estabelecido. Na ausência de dados suficientes, o uso durante estes períodos não é recomendado.

O produto não deve ser utilizado no caso de hipersensibilidade ou alergia a qualquer um dos constituintes da formulação.

