

VIRIGO

SUPLEMENTO ALIMENTAR

Apresentação

Embalagem de 60 cápsulas

Ingredientes	Por		TDR	
	1 Cápsula	% VRN*	(2cápsulas)	% VRN*
Extrato de <i>Tribulus terrestris</i> (padronizado a 40% de saponinas)	300 mg	-	600 mg	-
L-Arginina	50 mg	-	100 mg	-
Citrato de Zinco (Zn Elemento: 30%)	10 mg	30 %	20 mg	60 %

Antiaglomerantes: Celulose microcristalina, Dióxido de silício.

Cápsula: Gelatina, Dióxido de Titânio (Corante).

*VRN = Valores de Referência do Nutriente: Regulamento (EU) nº 1169/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2011.

Indicações

Estimula a produção de testosterona.

Aumenta o vigor sexual.

Activa o crescimento da massa muscular e diminui a massa gorda.

Aumenta a capacidade de resistência e garante uma melhor recuperação ao esforço físico.

Reduz a taxa de colesterol.

Normaliza a pressão arterial

Toma diária recomendada (TDR)

1 Cápsula, 2 vezes por dia, às principais refeições.

Características

Tribulus terrestris

Aumenta em 30% a produção de testosterona (em 5 dias).

Actua sobre a função reprodutora masculina, aumentando a espermatogénese e a mobilidade dos espermatozoides.

Permite aos desportistas aumentar a sua massa muscular, assegura uma melhor resistência e uma recuperação mais rápida ao esforço físico. Estimula a libido masculina e feminina.

Aumenta a taxa de FSH (Hormona Folicestimulante). Aumenta a taxa de Oestradiol, reactivando a função ovária da ovulação, acção protectora importante contra as litíases urinárias.

L-Arginina

Mantém uma vitalidade sexual constante. Aumenta a massa muscular nos desportistas, limita a perda de massa muscular nos doentes hospitalizados ou imobilizados e acelera a cicatrização.

Zinco

Mineral indispensável a uma boa composição do esperma e promove a fertilidade masculina.

Recomendações

Não deve ser excedida a toma diária indicada.

Os suplementos alimentares não são substitutos de um regime alimentar variado e equilibrado nem de um modo de vida saudável.

Conservar na embalagem original protegida da luz, em local seco e a temperatura inferior a 25°C.

Manter fora da vista e do alcance das crianças.

O uso seguro durante a gravidez e amamentação não foi estabelecido. Na ausência de dados suficientes, o uso durante estes períodos não é recomendado.

O produto não deve ser utilizado no caso de hipersensibilidade ou alergia a qualquer um dos constituintes da formulação.

